

Mauvaise façon de répondre à un QRC

Le triage vous envoie un enfant en réanimation. L'infirmière crie : « Besoin d'un médecin ici VITE! » À votre arrivée, vous trouvez un enfant de 12 ans qui saigne à profusion par la bouche. Son père vous informe qu'elle a subi une amygdalectomie il y a six jours. Elle se portait bien jusqu'à il y a une heure. L'enfant est pâle, ne répond qu'aux voix fortes; elle a des haut-le-cœur et vomit du sang. L'examen rapide de l'oropharynx de l'enfant révèle que l'hémorragie en cours provient de la loge amygdalienne gauche. Voici les signes vitaux – FC : 140 bpm; FR : 10/min; TA : 85/65 mm Hg; température : 36,4 °C; saturation : 89 % à l'air ambiant.

Dans le cadre de ce scénario, énumérez **QUATRE** interventions essentielles pour prendre en charge cet enfant. 4 points

Une seule réponse par ligne. Le correcteur doit valider ou rejeter la réponse d'après la première partie. Toute inscription au-delà de la ligne est superflue et ne peut être prise en considération.

*Puis 10mg/kg
de sang 0-*

1. *Obtenir un accès vasculaire i.v. ou i.o., donner 20mg/kg de salin 0,9%*

2. *Préparer l'intubation* *3,5 + âge / 4 = TET de 6r5*
préparer la kétamine (2mg/kg) ou l'etomidate (2,3mg/kg)

Écrire lisiblement. Si le correcteur ne peut pas lire la réponse, il ne peut pas la noter et il est dans l'obligation d'attribuer un zéro à toute réponse illisible.

3. *Prévenir le ~~SDRA~~*

Ne pas utiliser d'abréviations, sauf si elles sont reconnues universellement. En cas de doute, écrire la réponse au long.

4. *Envisager de déclencher le PHP/TM*

Important aussi: Il fallait QUATRE réponses à cette question. Le correcteur arrête donc de lire après la 4^e réponse, que la suite soit exacte et appropriée ou pas.

5. Garder l'enfant au chaud, maintenir la temp. centrale > 36°C

6. 1g d'ATX i.v. serait une excellente idée

7. Faire un paquetage de l'oropharynx pour essayer de maîtriser le saignement

Il faut
2 succubes
rigides
pour nettoyer
le sang

Rocuronium
1mg/kg
Solution pour
saupoudrage des voies
respiratoires p.ex. masque
laryngé no 3